

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
Vitaminthe féreghajtó paszta A.U.V.

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**

Virbac S.A. (L.I.D.-1<sup>ère</sup> Avenue-2065 m, 06516-Carros, Franciaország)

**2. Az ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**

Vitaminthe féreghajtó paszta A.U.V.

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

10 ml paszta tartalmaz:

**Hatóanyagok:**

Niklozamid	2,4 g
Oxibendazol	0,3 g

**4. JAVALLAT(OK)**

Fonálférges és galandférges okozta fertőzöttség gyógykezelésére. Hatékony az alábbi fajok ellen:

Toxocarasp., Toxascarisleonina, Ancylostomaspp., Uncinariastenocephalasp., Dipilydiumcaninum, Taeniaspp.

**5. ELLENJAVALLATOK**

Nincsenek.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

Hányinger, hányás, hasmenés előfordulhat.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, az alkalmazási utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

**7. CÉLÁLLAT FAJOK**

Kutya, macska.

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) ÉS MÓDSZEREK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Szájon át. A készítmény általános adagja 0,5 ml/ttkg. A pontos adagolást a fecskendő dugattyúján lévő skála segíti, egy osztás 1 ml-nek felel meg.

A fiatal állatokat 6 és 12 hetes kor között kétszer kell kezelni 1 hónapos különbséggel.

A felnőtt állatokat ajánlott évente kétszer kezelni.

A nőivarú egyedeket vemhesítéskor, 1 héttel kölykezés előtt és 3-4 héttel a kölykezés után kell kezelni.

**9. TANÁCSOK A MEGFELELŐ ALKALMAZÁSHOZ**

A pasztát közvetlenül az állat nyelvére vagy eledelbe keverve lehet adni.

**10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nem értelmezhető.

**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 18 hónapig.

Az eredeti csomagolásban, 25°C alatt tárolandó.

**12. KÜLÖNLEGESFIGYELMEZTETÉS(EK)**

**Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

A kezelést követően az állatok a férgeseket a bélsárral ürítik, ezért a fertőzött bélsarat össze kell gyűjteni és megsemmisíteni. A kezelést követő napokban a gyermekeket tartsuk távol a kezelt állattól.

Alkalmazást követően kezét kell mosni.

**Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás**

Vemhes állatokon történő alkalmazás esetén különösen fontos az adagolás pontos betartása.

**Túladagolás**

A többszörös túladagolás is jól tolerálható.

**13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges gyógyszereket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

**14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2012. szeptember 24.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

**15.1. Rendelhetőség**

Állatorvosi vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

**15.2. Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**15.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság**

5, 10, 25 ml-es polietilén fecskendő papírdobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

**15.4. Törzskönyvi szám**

3210/1/12 NÉBIH ÁTI (5 ml)

3210/2/12 NÉBIH ÁTI (10 ml)

3210/3/12 NÉBIH ÁTI (25 ml)

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Virbac Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselő

1055, Budapest, Szent István krt. 11. II. 21.