

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
Strantel 230/20 ízesített filmtabletta macskák részére A.U.V.

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,  
Loughrea,  
Co. Galway,  
Írország

**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Strantel 230/20 mg ízesített film tabletták macskák részére A.U.V.  
Pirantel embonát, prazikvantel

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

Tablettánként 230 mg pirantel-embonátot és 20 mg prazikvantelt tartalmaz.  
Fehér- piszkosfehér bikonvex bevont tabletták, egyik oldalán törővonal található, a másik oldala sima felületű. A tabletták két egyenlő részre oszthatók.

**4. JAVALLAT(OK)**

A következő gasztrointesztinális fonálféreg és galandféreg fajok által okozott kevert fertőzések gyógykezelésére:

Fonálféreg : *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*,

Galandféreg : *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*.

**5. ELLENJAVALLATOK**

Piperazin tartalmú készítményekkel egyidejűleg nem alkalmazható.

6 hetes kor alatti macskáknál nem alkalmazható.

Nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szembeni ismert túlérzékenység esetén.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

Nagyon ritka esetekben emésztőszervi zavarok (pl.: hányás) és a neurológiai tünetek, mint például ataxia és izomremegés előfordulhatnak.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:

- nagyon ritka (10000 állatból kevesebb, mint 1-nél jelentkeznek, beleértve az izolált eseteket is).

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

**7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)**

Macska

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Egyszeri szájon át történő alkalmazásra.

*Adagolás*

A javasolt dózisok a következők: 20 mg pirantel (57,5 mg/kg pirantel-embonát) és 5 mg/kg prazikvantel. Ez megfelel 1 tablettának 4 testtömeg-kilogrammonként.

Testtömeg	Tabletták száma
1,0 – 2,0 kg	½
2,1 – 4,0 kg	1
4,1 – 6,0 kg	1 ½
6,1 – 8,0 kg	2

*Alkalmazási mód és kezelési időtartam*

A tabletták a macskának adható közvetlenül vagy szükség esetén táplálékba keverve.

Fonálféreg fertőzöttség esetén, különösen macskakölyköknél, nem számíthatunk a paraziták teljes mértékű eliminációjára, így a humán fertőződés veszélye fennmaradhat.



Ezért az elválasztás utáni 2-3. hétig, 14 napos időközökben, megfelelő fonálféreg-ellenes szerrel meg kell ismételni a kezelést. Ha a betegség jelei továbbra is fennállnak vagy megjelennek, forduljon állatorvoshoz.

### **9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT**

A megfelelő adagolás érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell meghatározni.

### **10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Nem értelmezhető.

### **11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

A fel nem használt fél tablettákat el kell dobni.

Tartsa a blisztert a dobozban.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a fólián és a kartondobozon az {EXP} után feltüntetett lejáratási időn belül szabad felhasználni.

### **12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan

A bolhák egy gyakori galandféregfaj, a *Dipylidium caninum* köztigazdái.

A galandféreg-fertőzés kiújul, ha nem kerül sor a köztigazdáik, például bolhák, egerek stb. elleni védekezésre.

Ha az újbóli fertőzés kockázata fennáll, az állatorvos tanácsát kell kérni az ismételt beadás szükségességével és gyakoriságával kapcsolatban. Figyelembe kell venni a helyi epidemiológiai információkat és a macska életkörülményeit. Fontos, hogy eltávolítsuk az esetleges újbóli fertőzés forrásait, például a bolhákat és az egereket.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Egy adott anthelmintikum-csoporttal szembeni rezisztencia bármely, a csoportba tartozó anthelmintikummal való gyakori, ismételt kezelés után kialakulhat.

Mivel a tabletták izesítettek, azokat biztonságos helyen kell tárolni az állatok elől elzárva.

A készítmény beadását megelőzően az állatorvosnak meg kell vizsgálni a rossz állapotban lévő vagy erősen fertőzött állatokat, melyeknek tünetei a következők lehetnek: hasmenés, hányás, paraziták jelenléte a bélsárban, hányás, szőrzet rossz állapota.

A súlyosan legyengült, vagy erősen fertőzött macskák esetében a készítmény, kizárólag a felelős állatorvos által elvégzett előny / kockázatelemzésének megfelelően alkalmazható.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A tablettá véletlen lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását. A megfelelő higiénia biztosítása érdekében a tablettát közvetlenül a macskának adó, vagy azt a takarmányba keverő személynek a tablettá alkalmazását követően kezét kell mosni.

Vemhesség és laktáció:

Vemhesség alatt nem alkalmazható, de a laktáció idején alkalmazható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Az ajánlott adag 5-szörösénél nagyobb dózisban beadva az intolerancia tünetei, mint például hányás mutatkoztak.

Egyéb óvintézkedések:

Az Echinococcosis veszélyt jelent az emberre. Az Echinococcosis az Állat-Egészségügyi Világszervezet (OIE) bejelentési kötelezettsége alá tartozó betegség, kezelésére specifikus útmutatók vannak. Ezeket a betegség követése és az emberek védelme érdekében az illetékes hatóságtól be kell szerezni. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

### **13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.



**14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA**  
2018. november 16.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 or 1000 tableta  
Előfordulhat, hogy nem minden készlet kerül kereskedelmi forgalomba.

